



Kadmiumhalt i blod

Kadmiumhalt i blod <10 nmol/l

- Om resultatet från tre kontroller i följd är mindre än 10 nmol/l, behövs inga ytterligare kontroller, förutsatt att arbetet sker under oförändrade förhållanden

Kadmiumhalt >10 nmol/l men <50 nmol/l

- Om resultatet från tre kontroller i följd är mindre än 50 nmol/l, skall kadmiumhalten i blod kontrolleras var 12 månad, så länge som arbetet sker med oförändrad eller minskad kadmiumexponering

Kadmiumhalt >50 nmol/l men <75 nmol/l

- Om kadmiumhalten i blod är >50 nmol/l, utred och åtgärda orsaken
- Om kadmiumhalten i blod är mellan 50–75 nmol/l, skall kadmiumhalten i blod kontrolleras var 6 månad.
- Om resultatet från tre kontroller i följd är mindre än 50 nmol/l, skall kadmiumhalten i blod kontrolleras var 12 månad.

Kadmiumhalt >75 nmol/l

- Om kadmiumhalten i blod är >75 nmol/l - arbetsförbud tills kadmiumhalten i blod är under 50 nmol/l - och arbetstagaren skall genomgå en läkarundersökning (dock utan bedömning för tjänstbarhetsintyg).

Referensvärde för kadmium i blod hos icke-yrkesexponerade

- *Icke-rökare: 1–4,5 nmol/L*
- *Rökare upp till 9–10 nmol/L*
- *Rökare, som rökt mycket och länge, kan ha upp till 50 nmol/L*